



INFOSHEET  
VOOR  
DE GASTRO-  
ENTEROLOGEN

Studie  
complicaties coloscopie  
en perceptie coloscopie  
in doelgroep

Studie complicaties tijdens coloscopie n.a.v. FIT+ uit het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker (BVO DDK)

Tran, 2024, <https://doi.org/10.3390/gidisord6010003>

- In recente studie werd aantal bloedingen en perforaties na coloscopie n.a.v. FIT+ in BVO DDK onderzocht (periode 2013-2019, in totaal 69.385 coloscopieën).
- Het aantal bloedingen daalde van 0,9-1,1% (vóór 2017) naar 0,3% (2017-2018) en verder naar 0,05% (2019).
- Het percentage perforaties bleef met 0,05-0,11% stabiel (2014-2019).
- Aantal bloedingen en complicaties is laag en conform de richtlijnen.
- Kans op bloedingen hoger bij: mannen, poliepectomie, algemene verdoving en recent gebruik van bloedplaatjesaggregatiemmers/antitrombotica.
- Kans op perforatie hoger bij: onvolledige coloscopie, poliepectomie, algemene verdoving en recent gebruik van bloedplaatjesaggregatiemmers/antitrombotica.
- Concentratie van hoogst aantal complicaties in kleine groep endoscopisten: bv. 16 endoscopisten met hoogste % bloedingen (top 5) voerden slechts 6% van het totaal aantal coloscopieën na FIT+ uit, terwijl hun patiënten maar liefst 45,5% van de bloedingen vertegenwoordigen.

Nog geen tijd gehad.  
Want ik moest nog  
een training geven.

Onderzoek  
vanaf 50 tot  
en met 74 jaar

Nieuw!


- Folder bij uitnodiging bevat nu ook QR-code naar 10 vertalingen
- In 2024 zullen 74-jarigen bij hun laatste uitnodiging een aangepaste brief ontvangen met enerzijds nadruk op laatste uitnodiging, en anderzijds uitleg over mogelijkheid om nadien - in overleg met huisarts - alsnog 2-jaarlijks een stoelgangtest uit te voeren buiten het BVO.
- De huisarts ontvangt vanaf 2024 jaarlijks overzicht niet-deelnemers.



Marc Herremans  
Ambassadeur Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

GEEN EXCUSES. DOE DE STOELGANGTEST. IK DOE HET!

## Bloedingen en perforaties bij colo na FIT+ uit BVO DDK - Vlaanderen (2013-2019)



### Actiepunten:

- Nood aan centraal coloscopieregister voor monitoring kwaliteit coloscopie n.a.v. FIT+ uit het BVO.
- Gesprekken met beroepsgroepen zijn opnieuw gaande.
- Informatie verwerken in informatie aan de doelgroep.
- Nood aan getuigenissen van personen die coloscopie lieten uitvoeren na FIT+.

## Online survey naar ervaringen coloscopie na een afwijkende FIT in het BVO DDK

Hoeck, 2024,

<https://doi.org/10.3390/gidisor6010004>

Online survey, 1597 FIT+ respondenten, enkele resultaten:

- Groep geen colo gehad: drempels colo na FIT+ geen symptomen, perceptie vals positieve FIT, andere medische prioriteiten, 1/2 angst voor coloscopie, 1/3 angst voor complicaties, 1/3 schaamte.
- Groep wél colo gehad: colo was minder vervelend dan vooraf gedacht (wel vervelende voorbereiding), slechts 3% voelde schaamte, slechts 5% vond coloscopie erg vervelend, 99% zou opnieuw colo doen.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Patrick Martens

Directeur, vzw Centrum voor Kankeropsporing

## Screeningsjaar 2022



In 12/2023 verscheen het **nieuwe jaarrapport** van CvKO en BCR.

De responsgraad en totale dekkingsgraad worden wel eens door elkaar gehaald.


**Totale dekkingsgraad:** In 2022 was 64,2% van de 50 t.e.m. 74-jarigen 'in orde' met het vroegtijdig opsporen van dikkedarmkanker (versus 64,3% in 2021). Dit is ook vergelijkbaar met het BVO BK (64,7%) en het BVO BHK (64,5%) (<24 maanden).

**Responsgraad:** in 2022 ging 48,3% in op onze uitnodiging voor het BVO DDK (< 12 maanden na de uitnodiging). Een daling van 4,2% t.o.v. 2021.

## SCREENINGSJAAR 2022 IN EEN NOTENDOP



## 73% vroegtijdig gevonden



### Aandachtspunten:

- Jongste groepen nemen minder deel.
- 25,5 % van de doelgroep heeft nog nooit deelgenomen.
- Opvolgingsgraad van afwijkende stoelgangstesten kan nog beter.

## Meer weten?

Ga naar

<https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/dikkedarmkanker/professionelen>

voor meer informatie over het BVO DDK